

水稻作付者 各位

ながさき西海農協 小値賀支店

稲作情報 2

本年のコシヒカリは、夜温が低めに推移している為、やや遅れ気味の生育となっておりますが、草丈、茎数、葉数は平年並みになっています。

4月4日の田植えで、出穂期は7月8日頃となり、
穂肥の時期は6月29日頃となっています。

4月15日の田植えで、出穂期は7月12日頃となり
穂肥の時期は7月2日頃となっています。

病害虫については、いもち病の発生が懸念されますので、キタジンP粒剤の散布を

4月上旬田植えで6月25日～29日。

4月中旬田植えで6月28日～7月2日に散布をお願いします。

病害虫 いもち病 キタジンP粒剤 (3kg/10a)

ヘリコプター防除は、7月16日～18日を予定しております。

*穂肥時期の判断

親株を抜き茎の基部をカミソリで割り幼穂長の長さを確認して穂肥時期を決める。

*穂肥量の判断

葉色板(カラースケール)より判断 葉色が濃い場合は、時期を遅らせるか穂肥量を控えて下さい。(営農ごよみ 17ページ 穂肥を参照)

*生育後半の水管理

穂ばらみ期まで間断灌水をおこない、出穂開花期は灌水状態を保つように水管理をおこなって下さい。(営農ごよみ 18ページ 生育後半の水管理を参照)